

TERAPIANBEFALING TIL GEIT

PARASITTBEHANDLING

Indikasjon	Farmaka	Dosering(mg/kg)	Preparatnamn	Merknad
Koksidiar	Toltrazuril	20	Baycox®	Kurativt eller profylaktisk.Mest vanleg hos kje på inneføring. Sjeldnare etter utslepp på beite.
	Sulfadimidin	200/d x 3		
Løpe- og tarmnematodar	Albendazol	5 - 10	Valbazen® mikstur	Auka dosering til geit, ikkje 1. drektigheitsmnd.
	Fenbendazol	5 - 10	Panacur® Curaverm®	Auka dosering til geit.
	Ivermectin	0,2 - 0,3	Noromectin inj. hell på Ivomec® inj.mikstur,hell på	
	Doramectin	0,2 - 0,3	Dectomax® inj.hell på	
	Eprinomectin	0,5 - 1,0	Eprinex® hell på	
Lungeorm	Albendazol	1,0/dag x 14	Valbazen® mikstur	Dagleg behandling i 14 dagar. Ikkje 1 drektigheitsmnd.
	Fenbendazol	1,25/dagx7x2	Panacur® Curaverm®	Gjenta behandling etter 14 dagar
	Ivermectin	0,2 - 0,3	Noromectin inj. hell på Ivomec® inj.mikstur,hell på	Auka dosering til geit?
	Doramectin	0,2 - 0,3	Dectomax® inj.hell på	Auka dosering til geit?
	Eprinomectin	0,5 - 1,0	Eprinex® hell på	Auka dosering til geit?
Flått	Flumetrin	2	Bayticol® liniment	2ml pr. 10 kg effekt i 4 veker
	Deltametrin	0,5-1	Coopersect® liniment	5 ml til vaksen geit, effekt i 4 veker
	Diazinon	25g/100 l. vatn	Neocidol® konsentrat	Bading profylaktisk og kurativt
Lus	Flumetrin	2	Bayticol® liniment	2ml pr. 10 kg.
	Deltametrin	0,5-1	Coopersect® liniment	5ml til vaksen geit
	Diazinon	25g/100 l. vatn	Neocidol® konsentrat	Vask/bad, gjenta etter 14 dagar (Ikkje markedsført)
	Ivermectin	0,2 - 0,3	Noromectin inj. hell på Ivomec® inj.mikstur,hell på	Berre blodsugande.
	Doramectin	0,2 - 0,3	Dectomax® inj.hell på	Berre blodsugande.
	Eprinomectin	0,5	Eprinex® hell på	

ANESTESI, SEDASJON OG ANALGESI

Indikasjon	Farmaka	Dosering(mg/kg)	Preparatnamn	Merknad
Sedasjon	Xylazin	0,1 i.v.- 0,2 i.m.	Rompun® Narcoxyl®	Godt utprøvd på geit
	Detomidin	0,01-0,04	Domosedan®	
Avhorning kje	Xylacin + ketamin	xylacin 0,1 + ketamin 6,6	Rompun® Narcoxyl® + Ketalar®	Blandar 0,5 ml xylacin 20 mg/ml med 10 ml. Ketamin 50mg/ml. Gir 1 ml av denne blandinga pr. 7,5 kg lev.vekt. Obs. smertebehandling
Generell anestesi	Xylazin + ketamin	xylacin 0,2 + ketamin 5 i.m	Rompun® Narcoxyl® + Ketalar®	Lite utprøvd på vaksen geit
Epiduralanestesi	Lidokain	3-5 ml i for.lumb.	Lidokel-Adrenalin vet®	
Lokalanestesi	Xylacin + lidokain	xylacin 0,1 - 0,2 lidoc. Varierende	Rompun® Narcoxyl® + Lidokel®	
Smertelindring	Xylacin	0,05 i.m	Rompun® Narcoxyl®	Kortvarig verknad, gir samtidig sedasjon
	Meloksikam	0,5 s.c., i.v.	Metacam® inj. 20 mg/ml	2,5 ml pr.100 kg, Forsøksvis suspensjon per os.
	Flunixin	2,2 i.m.,i.v.	Finadyne®	Best dokumentert på geit
	Ketoprofen	3 i.m.,i.v.	Romefen® Comforion®	3 ml pr.100 kg
Alfa-2-antagonist	Atipamezol	Varierer	Antisedan®	Kun ved fare for resp.stans.Ingen MRL-plassering.

TERAPIANBEFALING TIL GEIT

HORMON					
Indikasjon	Farmaka	Dosering(mg/kg)	Preparatnamn		Merknad
Fødsel-/brunst synkronisering	Cloprostenol	0,3-0,4 ml	Estrumate®		Dose til vaksa geit
	Dinoprost	1-2 ml	Dinolytic®		
Brunstmangel/brunstsynkr.	Progesteron	intravaginal	Eazi Breed CIDR™		Ikkje markedsført i Europa
	Medroxyprog.	intravaginal	Veramix®		Etter søknad. Ikkje til lakterende dyr.
Fødselshjelp/keisersnitt	Isoxsuprin-laktat	4 - 5 ml. i.m.	Duphaspasmin®		Etter søknad.
Ulike	Dexametason	3-5 ml.	Vorenvet®		Risiko for partusindusering i siste trimester
VITAMIN OG MINERAL					
Indikasjon	Farmaka	Dosering	Preparatnamn		Merknad
CCN	Vitamin B1	10 ml.i.v	Thiamin inj.		Apotekframstilt preparat
Melkefeber	Kalsium	100 ml. i.v./s.c.	Calci-ke®		
EMD	Vitamin E Natriumselenitt	1 ml. pr.5 kg	Selenvit® inj.		
Andre	Vitamin A,D,E	2 - 5 ml	ADEsan® vet		
ANTIBAKTERIELLE MIDLAR					
Sjukdom	Aktuelle mikrobar	Antibiotika førstevalg	Antibiotika andrevalg		Merknad
Mastitt	Stafylokokker	Penicillin	Amoksicillin		Generell behandling evt lokalbehandling 5 døgn. Tilleggsterapi, oksytocin,kortikoider/NSAIDs
Pneumoniar	Pasteurella	Penicillin	Amoksicillin/ampicillin		Behandle minimum 3 døgn
	Mycoplasma	Tetracykliner			Kun etter sikker diagnose
Metritt	Blandingsflora	Penicillin	Sulfa+trimetoprim		Tilleggsterapi:oxytocin,prostaglandin,NSAIDs
Encefalitt	Listeria mono.	Benzylpenicillin			>5 mill I.E.+ thiamin i.v. etterfulgt av Penicillin i.m.
Enterittar	Clostridium perfringens	Penicillin, Sulfa+ trimetoprim	Dihydrostreptomycin		Ofte foringsbetinga. Antibiotika lite aktuelt. Vaksinasjon 2 - 3 gonger årleg ved problem
	Andre	Dihydrostreptom.			
Konjunktivitt		Oksytetracyklin/polymyxinB	Fucidinsyre		Preparata her ingen MRL-plassering (ulovleg)
Spedyrinfeksjon	E.coli Stafylokokkar	Sulfa+trimetoprim Penicillin	Sulfa+trimetoprim		Peroral behandling kombinert med glukose/elektrolytt-oppløsning. Ved septikemi parenteral behandling.
VAKSINASJON AV GEIT					
Sjukdom	Vaksine	Dosering	Godkjent for geit		Merknad
Enterotoksemi	Ovovac®	2 ml	Nei		Enkelte veterinærer aukar dosa til 4 ml
	Ovovac P®	2 ml	Nei		Produsenten anbefaler ikkje bruk på geit
	Covexin 8®	2 ml, 5 ml	Nei		Produsenten anbefaler 5 ml ved første grunnvaksinerings
Paratuberkulose	Gudair®	1 ml	Ja		Ikkje markedsføringstillatelse i Norge, godkjenningssfritak